

## Lijst chronische fysio- en oefentherapie 2019

De basisverzekering vergoedt fysiotherapie en oefentherapie bij aandoeningen die op deze lijst chronische fysio- en oefentherapie staan. Soms geldt er een maximale behandelduur. Die staat dan bij de aandoening. Net als tot welke leeftijd wij de zorg vergoeden.

1. Aandoeningen van het zenuwstelsel		
aandoening	Leeftijd	maximale behandelduur
cerebrovasculair accident		
ruggenmergaandoening		
multipele sclerose		
perifere zenuwaandoening, als sprake is van motorische uitval		
extrapyramidale aandoening		
motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel	tot 17 jaar	
aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel		
cerebellaire aandoening		
uitvalsverschijnselen door een tumor in de hersenen of het ruggenmerg, of door hersenletsel		
radiculair syndroom met motorische uitval		3 maanden
spierziekte		
myasthenia gravis		

2. Aandoeningen van het bewegingsapparaat		
Aandoening	leeftijd	maximale behandelduur
aangeboren afwijking		
progressieve scoliose		
juvenile osteochondrose	tot 22 jaar	
reflexdystrofie		
botbreuk door morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget		
frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)		12 maanden
hyperostotische spondylose (morbus Forestier)		
collageenziekten		
status na amputatie		
whiplash		3 maanden. Als hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, kan deze periode verlengd worden met maximaal 6 maanden
postpartum bekkeninstabiliteit		3 maanden
fracturen als deze conservatief worden behandeld		6 maanden na conservatieve behandeling

3. Overige aandoeningen		
aandoening	leeftijd	maximale behandelduur
aangeboren afwijking van de luchtwegen		
Lymfoedeem		
littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma		
status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie, waarbij de hulp dient voor bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling		12 maanden na ontslag
perifeer arterieel vaatlijden in stadium 3 Fontaine		12 maanden
weke delen tumoren		2 jaren na bestraling
diffuse interstitiële longaandoening als sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis		